

بچے کے بعد برٹھ کنٹرول: والدین کا گائیڈ

بچہ پیدا کرنے کے بعد، آپ کے لیے صحیح برٹھ کنٹرول تلاش کرنے کے والے سے آپ کے ساتھی (اگر چاہیں) اور آپ کی طبی ٹیم کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے۔ اس بارے میں مختلف طریقوں کے بارے میں جانیں، پیدائش کے بعد مختلف اوقات میں ان کے تحفظ اور افادیت کو سمجھیں اور یہ بھی جانیں کہ یہ طریقے چھاتی/سینے سے دودھ پلانے کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں۔ پیدائش پر قابو پانے والے بارمنز دودھ کے معیار کے لیے نصیان دہ نہیں بوتے، مگر ایسٹروجن والے طریقے (نیچے نیلے رنگ میں دیکھیں) دودھ کی پیداوار کو کم کر سکتے ہیں۔ اور ایسٹروجن بعد از پیدائش کے پہلے چند بیغون میں کچھ طبی خطرات کو بھی بڑھا دیتا ہے۔

													انول کے بعد 10 منٹ کے اندر
													پیدائش کے بعد 24 گیفوں کے اندر
													پیدائش کے بعد 1 تا 3 دنوں کے اندر
													پیدائش کے بعد 3 تا 4 بیغون کے اندر
													پیدائش کے بعد 3 تا 4 بیغون کے اندر
													پیدائش کے بعد 4 تا 6 بیغون کے اندر
													پیدائش کے بعد 4 تا 6 بیغون کے اندر
													پیدائش کے بعد 6 یا زیادہ بیغون کے اندر

چھوٹے خدشات ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس مدت میں اچھا کام نہ کریں

کوئی تشویش نہیں اور صحیح طریقے
سے استعمال کرنے پر اچھا کرتا ہے